

Rhacodactylus Leachianus • Neukaledonischer Riesengecko

Generelles • Description

Der Riesengecko erhielt seinen Trivialname durch seine entsprechende Größe .

Eine in der Natur kaum variable Art, die zeitweise als ausgestorben galt und erst 1994 wiederentdeckt wurde.

Während Biotope weiterhin zerstört werden, wird die Art in Terrarien zigfach nachgezogen. Es gibt eine Reihe von Zuchtformen.

Schöne Art auch für Beginner.

Common name from nearly looking to Cresti. Highly variable colouration even in nature, several morphs are bred. Was assumed to be extinct until rediscovered in 1993. While the environment gets destroyed further, herpers around the world breed them in high numbers. Good species for beginners.

Schutzstatus • Protection


Keiner, aber keine Ausfuhr möglich • *None, but no export possible*

Größe • Adult Size Je nach Form bis 33cm

Vorkommen • Distribution : Süden Neukaledoniens • *southern parts of New Caledonia*

Biotop • Environment

nachtaktiv im Blätterdickicht dicht bewachsener, feuchtwarmer Tieflandregenwälder • *nocturnal in the leafs and branches of lowland rain forests*



Haltung • Captive Care

Halbfeuchtes Terrarium mindestens 80x60x80 cm BTH. Temperatur tags 20–27 °C, nachts 20 °C. Luftfeuchtigkeit 60–80 %.

Sonstiges: Tageslichtleuchtstoffröhren, Rückwand zum Klettern gestalten, dichte Bepflanzung, Wasserschale. Regelmäßiges Sprühen, Bodengrund Torf-Sand-Gemisch feucht halten, ca. 8 cm hoch. Lebenserwartung: etwa 20 Jahre.

Semi-humid terrarium at least 50x40x80 cm WDH. Temperature 20–27 °C daytime, 20 °C at night, humidity 60–80 %. Daylight fluorescent lamps, prepare back wall for climbing, regular spraying, dense planting necessary, water bowl. Use humid peat-sand mix as substrate at least 8 cm high. Life span: around 20 years.

Futter • Food

Insekten und Larven, Repashy, Pangea, Fruchtbrei aus reifen Bananen und Babybrei (Pfirsich/Maracuja), Vitamine & Mineralien (z.B. Herpetal Complete) • *insects and larvae, baby mice, fruit pulp (bananas and baby pulp peach/maracuja), vitamins & minerals (e.g. Herpetal Complete)*

Zucht • Reproduction

Paar-/Gruppenhaltung, nur ein Männchen, am besten 1,1

Tiere. Auch Weibchen können sich gegenseitig stressen und attackieren . Besonders bei eierlegenden Weibchen können Stress und Calciummangel rachitische Erscheinungen auslösen. Zweimonatige

leicht kühle Phase, Paarungen in den Monaten danach, mehrfach werden je 2 Eier vergraben. Inkubation bei 24–29 °C

Pairs or groups, only one male. Stress may occur between females. Specially egg-laying females tend to show signs of rickets when proned to stress and calcium deficit. Cooler period of 2 months, matings follow in the months after. Several clutches of 2 eggs are burried. Incubation at 24–29 °C, sex depends on temperature. Young may need single paring when stressed

Mehr Informationen:

Rheingau Geckos

65347 Eltville

Tel: 0176 4480310

Homepage: <https://rheingau-geckos.jimdo.com/>

Email: rheingau.geckos@gmx.de